

**PROTOCOLE DETAILLANT LES MESURES PREVENTIVES
D'HYGIENE GENERALE ET D'HYGIENE RENFORCEES A
PRENDRE EN CAS DE MALADIE CONTAGIEUSE OU D'EPIDEMIE,
OU TOUT AUTRE SITUATION DANGEREUSE POUR LA SANTE**

Il est à rappeler que la fréquentation de la collectivité par l'enfant à la phase aiguë d'une maladie infectieuse n'est pas souhaitable.

I. Les mesures préventives d'hygiène générale

Mesures appliquées au quotidien par les adultes et les enfants.

1. Hygiène générale des locaux, du matériel, du linge et alimentation

- Nettoyage quotidien des surfaces lavables en insistant sur les surfaces les plus touchées par :
 - les adultes : interrupteurs, poignées de portes, téléphones, clavier, digicode...
 - les enfants : barrières, tables et chaises,...
 - Une attention particulière sera apportée à l'entretien des sanitaires

Produits utilisés :

- Vapodil et/ou nettoyant-dégraissant : plans de change, tables, chaises des enfants, sol salle repas
- Produit écologique : bicarbonate + vinaigre blanc + huile essentielle de lavandin
➔ salles de bain
- Crème à récurer pour les sanitaires (salles d'eau et WC)
- WC des enfants : vinaigre si tartre
- Détartrant WC : 1 fois par jour
- Vidage quotidien des poubelles à couvercle avec action par pédalier, chaque objet ou produit doit être jeté dans une poubelle munie d'un couvercle
- Changement du linge dès que nécessaire :
 - Draps des enfants : 1 fois tous les 15 jours.
 - Bavoirs, gants, serviettes : tous les jours, plusieurs fois
- Nettoyage du linge : Se référer au PMS (plan de maîtrise sanitaire) page 25

Serviettes souillées, bavoirs, gants et sur chaussures lavés à 60°C (les bavoirs sont individuels et lavés après chaque utilisation)

- Lavage quotidien du matériel et des jouets : VAPODIL et/ou eau + savon de Marseille
- Aération régulière des pièces de vie : au minimum 10 minutes 2 fois par jour des pièces accueillant les enfants (excepté les jours de haut niveau de pollution)
- Ne pas surchauffer les locaux (18-20°C max)

- Respect scrupuleux des règles d'hygiène alimentaire dans la préparation et la distribution des repas : application de la méthode HACCP.

2. Hygiène individuelle du personnel

- Lavage des mains des adultes : temps essentiel, la contamination manu portée étant responsable de nombreuses infections
 - **À la prise de poste**
 - Avant chaque repas
 - Avant tout contact avec un aliment
 - Avant et après chaque change
 - Après chaque passage aux toilettes
 - Après mouchage, toux ou éternuement
 - Après manipulation d'objets possiblement contaminés (animaux, terre ...)
 - Après chaque contact avec un produit biologique (selles, urines, sang ...)
 - Avant et après chaque soin (administration d'un traitement (collyre, etc...), application de crème, ...)

Il se fait avec un savon liquide et de l'eau pendant 30 secondes, le séchage se fait avec du papier jetable. (cf fiche technique) Les ongles doivent être coupés et entretenus sans vernis. En l'absence de point d'eau, les SHA peuvent être utilisées.

- Hygiène vestimentaire du personnel : porter des vêtements de travail propres et fréquemment renouvelés.
- L'éducation des enfants sur l'importance de l'hygiène des mains est un temps important : il doit être fait avant et après chaque repas, après passage aux toilettes et après manipulation d'objets contaminés (terre, animaux...)

II. Les mesures d'hygiène renforcées en cas de maladies contagieuses ou d'épidémie (ou tout autre situation dangereuse pour la santé)

L'application des mesures usuelles d'hygiène doit être renforcée et parfois adaptée en cas de maladie contagieuse identifiée en fonction de la source et du mode de contamination afin d'en interrompre la chaîne de transmission.

1. De manière générale :

- Intensifier le nettoyage au Vapodil ou produit bactéricide, fongicide et virucide de toutes les surfaces

2. Contamination par les selles :

- Lavage de mains (cf hygiène individuelle) renforcé par l'utilisation du SHA
- Manipulation de produits biologiques avec des gants jetables et lavage des mains après les avoir enlevés
- Enfermer le linge souillé dans des sacs hermétiques
- Porter un tablier si besoin lors des changes ou se changer si on est souillé
- Nettoyer les plans de change et le lit souillé avec le produit détergent désinfectant (cf mesures préventives d'hygiène générale)

3. Contamination par sécrétions respiratoires :

- Lavage des mains (cf hygiène individuelle) renforcé par l'utilisation du SHA

- Nettoyage soigneux des sécrétions nasales avec des mouchoirs à usage unique
- Lavage de mains après avoir aidé un enfant à se moucher
- Eternuer ou tousser dans son coude, le port du masque est recommandé pour la personne malade et les sujets contacts
- Se moucher avec des mouchoirs en papier à usage unique jetés dans une poubelle à couvercle
- Lavage soigneux des surfaces, jouets, et autres objets présents dans les lieux fréquentés par la personne malade

4. Contamination à partir de lésions cutanées ou cutanéomuqueuses :

- Utilisation de gants à usage unique pour effectuer les soins d'une lésion : plaie sanglante, plaie infectée, impétigo ... Celle-ci doit être protégée. Le soin doit être suivi du retrait immédiat des gants et d'un lavage des mains.
- La lésion cutanée doit être protégée par un pansement. Le matériel de soin sera jeté.
- En cas de conjonctivite : nettoyer chaque œil avec une nouvelle compresse
- En cas d'infection du cuir chevelu (teigne, poux, impétigo ...) laver soigneusement les draps
- En cas de verrues : nettoyer soigneusement les sols et les tapis si les enfants y ont marché pieds nus.

Pour chaque type de pathologie, les mesures spécifiques à prendre en compte sont décrites dans la fiche correspondante : cf [Rapport du Haut Conseil de Santé Publique « Survenue de maladies infectieuses dans une collectivité Conduites à tenir en date de septembre 2012. »](#)

5. Contamination en cas d'exposition à du sang ou d'autres liquides biologiques infectés :

- En cas de plaie : lavage des mains, nettoyage de la lésion à l'eau et au savon, rinçage, désinfection avec une solution antiseptique (au sérum physiologique si contact avec une muqueuse) en portant des gants jetables
- Blessure accidentelle avec un objet potentiellement contaminé consulter un spécialiste le plus rapidement possible
- En cas de contact avec une muqueuse : rincer abondamment au sérum physiologique ou à l'eau
- Contamination d'une surface inerte par du sang : nettoyer la surface avec un papier à usage unique imbibé de produit (nettoyant, désinfectant) et décontaminer au Vapodil, le cas échéant produit bactéricide.

III. Autre situation dangereuse :

PLAN CANICULE : cf Protocole interne à la direction

IV. Affichage Lavage des mains

Au niveau de chaque point d'eau

❖ Protocole en lien avec le décret N° 2021-1131 du 30 Août 2021 (2^{ème} protocole)

HYGIÈNE DES MAINS SIMPLE ET EFFICACE



Mouillez-vous les mains avec de l'eau



Versez du savon dans le creux de votre main



Frottez-vous les mains de 15 à 20 secondes : les doigts, les paumes, le dessus des mains et les poignets



Entrelacez vos mains pour nettoyer la zone entre les doigts



Nettoyez également les ongles



Rincez-vous les mains sous l'eau



Séchez-vous les mains si possible avec un **essuie-main** à usage unique



Fermez le robinet avec l'**essuie-main** puis jetez-le dans une poubelle

*Si vous n'avez pas d'eau ni de savon, utilisez une solution hydroalcoolique pour adopter les mêmes gestes (étapes 2, 3, 4 et 5).
Veillez à vous frotter les mains jusqu'à ce qu'elles soient bien sèches.*

Les gestes de chacun font la santé de tous

